Le Grand Brochet

IDENTIFICATION

Son corps est très allongé et comprimé latéralement. Il est sombre, verdâtre à presque brun ou gris, et parsemé de taches pâles. Le bout des écailles est orné d'une petite tache dorée. Ses nageoires dorsale, caudale et anale sont tachetées de noir. Sa tête est longue et ses grands yeux sont positionnés sur le haut de sa tête. Sa bouche est grande et sa mâchoire inférieure dépasse légèrement le bout de son museau profilé. Il possède de grandes dents acérées. Il est possible d'observer 5 pores sensoriels sous chaque mâchoire inférieure. Sa nageoire caudale est fourchue et arrondie aux extrémités. À l'âge adulte, il mesure généralement de 50 à 75 cm et pèse entre 1 et 2 kg.

HABITAT

On le retrouve principalement dans les rivières sinueuses, les baies et les lacs. Il affectionne particulièrement les eaux peu profondes et chaudes où la végétation est dense. Lors des grandes chaleurs estivales, il n'est pas rare de le retrouver dans les eaux plus profondes et fraîches.

ALIMENTATION

Le grand brochet est un carnivore à l'alimentation très variée. Sa diète est principalement composée de poissons, tels que la perchaude, les meuniers, les crapets et les cyprins. Il peut également se nourrir d'insectes, d'écrevisses, de grenouilles, de rats musqués et de canetons. La taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la moitié de sa propre taille.

REPRODUCTION

Il se reproduit au printemps après la fonte des glaces, du mois d'avril au début de mai. La fraie a lieu le jour en eau peu profonde dans des plaines inondables à végétation dense dans les rivières, les marécages et les baies de lacs. Les mâles sont matures dès l'âge de 2 à 5 ans et les femelles à l'âge de 3 à 6 ans. Au moment de la fraie, une femelle de bonne taille est accompagnée d'un ou deux mâles plus petits. Les œufs ambre clair mesurent 2,5 à 3,0 mm de diamètre. Ils sont éparpillés au hasard dans l'eau, puis se fixent à la végétation. Une femelle peut pondre de 3 000 à 600 000 œufs selon sa taille. L'éclosion a lieu 12 à 14 jours après la ponte. Les alevins possèdent des glandes adhésives sur la tête. Celles-ci leur permettent de se tenir immobiles, fixés à la végétation pendant les 6 à 10 premiers jours de leur vie.

Source : www.mffp.qc.ca

Le Grand Brochet

Photo : hooke.ca

EN CUISINE

La chair du grand brochet a un goût délicieux et il est possible de le cuisiner de plusieurs façons.

Recettes avec brochet

Vidéo de préparation des filets sans arête

TECHNIQUES DE PÊCHE

Où : Eaux chaudes, peu profondes avec présence d'herbiers.

Comment : Pêcher à la traîne ou Lancer du bord.

Avec quoi :

- Cuillère (Red Devil, William)
- Leurre de surface (Stickbait, Popper)
- Spinnerbait
- Rapala

*** Fils d'au moins 12 lbs test avec leader d'acier.**